大正製薬株式会社	ナロンメディカル	解熱鎮痛剤

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説　明　文　書

ナロンメディカル

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名　称	ナロンメディカル
2	成分・分量	2錠中 イブプロフェン　200mg
3	用法・用量	症状があらわれた時、次の量をなるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用してください。 ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。服用間隔は4時間以上おいてください。 成人（15才以上）　1回2錠　1日2回まで　15才未満　服用しないこと
4	効能・効果	○肩こり痛・頭痛・腰痛・関節痛・神経痛・月経痛（生理痛）・咽喉痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛・耳痛・歯痛・抜歯後の疼痛の鎮痛 ○発熱・悪寒時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために	1．次の人は服用しないでください （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたことがある人。 （2）本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 （3）15才未満の小児。 （4）医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。 胃・十二指腸潰瘍、血液の病気、肝臓病、腎臓病、心臓病、高血圧、ジドブジン（レトロビル）を投与中の人 （5）出産予定日12週以内の妊婦。 2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3．服用前後は飲酒しないでください 4．長期連用しないでください 5．次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人又は次の医薬品を服用している人。 クマリン系抗凝血剤（ワルファリン）、アスピリン製剤（抗血小板剤として投与している場合）、リチウム製剤（炭酸リチウム）、チアジド系利尿薬（ヒドロクロロチアジド）、ループ利尿薬（フロセミド）、タクロリムス水和物、ニューキノロン系抗菌剤（エノキサシン水和物等）、メトトレキサート、コレスチラミン ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の診断を受けた人又はその病気にかかったことがある人。 胃・十二指腸潰瘍、血液の病気、肝臓病、腎臓病、心臓病、高血圧、気管支ぜんそく、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、潰瘍性大腸炎、クローン病
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。

2．法令により、要指導医薬品は必ず、第１類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。

3．服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。