

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

アンチスタックス



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	アンチスタックス(カプセル)
2	成分・分量	2カプセル(1日量)中 赤ブドウ葉乾燥エキス混合物……………450mg (赤ブドウ葉乾燥純エキス360mgに相当)
3	用法・用量	成人(20才以上)1回2カプセルを1日1回、朝に水又はぬるま湯で服用して下さい。 20才未満は服用しないで下さい。
4	効能・効果	軽度の静脈還流障害(静脈の血流が滞ること)による次の諸症状の改善: 足(ふくらはぎ、足首など)のむくみ、むくみに伴う足のだるさ・重さ・疲れ・つっぱり感・痛み
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2) 妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。</p> <p>(3) 20才未満の人。</p> <p>(4) 足以外のむくみ、又は全身にむくみのある人。</p> <p>(5) 足に激しい痛み、出血、色素沈着、びらんのある人。また足の皮膚が褐色調に変化したり、硬くなった人。</p> <p>(6) 次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、脳血管障害、動脈硬化症</p> <p>(7) 乳癌、子宮癌等の手術(リンパ節切除)や放射線治療を受けたことがある人。</p> <p>(8) 抗血小板剤(アスピリン、チクロピジン塩酸塩等)、抗凝血剤(ワルファリン、ヘパリン等)、血栓溶解剤(ウロキナーゼ等)で治療を受けている人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい かぜ薬、解熱鎮痛薬</p> <p>3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>上記1～3のいずれにも該当しないことを必ず確認して下さい。</p> </div> <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・60才以上の人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 息切れ、動悸、倦怠感、黄疸、尿量減少、血尿、貧血
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。