

販売元： 佐藤製薬株式会社
製造販売元： 佐藤製薬株式会社

ストナリニ Z

鼻炎用内服薬

第一類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ストナリニ Z



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ストナリニ Z
2	成分・分量	< 1錠中 > セチリジン塩酸塩 10mg
3	用法・用量	< 1回服用量 > 成人（15歳以上） 1錠 15歳未満 服用しないでください。 < 1日服用回数 > 1回（就寝前）
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分、ピペラジン誘導体（レボセチリジン、ヒドロキシジンを含む）によりアレルギー症状を起したことがある人。 (2) 次の診断を受けた人。腎臓病 (3) 15歳未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）及びテオフィリン、リトナビル又はビルシカイニド塩酸塩水和物を含有する内服薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 服用前後は飲酒しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 次の診断を受けた人。肝臓病、てんかん (3) けいれん発作を起こしたことがある人。 (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5) 高齢者。 (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。 (8) 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。