

販売元：森下仁丹株式会社
製造販売元：協和新薬株式会社

ペレウス

体毛育毛促進剤

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ペレウス
2	成分・分量	100g中 メチルテストステロン 0.5g
3	用法・用量	1日1、2回適量を患部に塗布してください。 【用法・用量に関する注意】 (1) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診療を受けてください。 (2) 内服しないでください。 (3) 本剤の有効成分メチルテストステロンは男性ホルモンのため、頭皮には使用しないでください。
4	効能・効果	眉毛脱毛、腋窩無毛、恥部無毛、薄毛（眉毛・体毛の発毛促進に）
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ご使用前に本剤を適量出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人 (3) 15歳未満の小児 (4) 妊婦、妊娠している可能性のある女性、授乳中の人 (5) アンドロゲン依存性腫瘍（例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍（悪性））及びその疑いのある人 (6) 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人 (7) 前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原（PSA）の値が2.0ng/mL以上の人（医師の判断に従うこと） ※本剤の有効成分（メチルテストステロン）は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。 ①特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。 ②継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。 ③検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談してください。 (8) 睡眠時無呼吸症候群である人 (9) 円形脱毛症の人 2. 次の部位には使用しないこと ①目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔等）、②頭髪、まつ毛、③陰茎部先端（尿道口）、恥部の粘膜部、④外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位 3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと 4. 使用者以外へ付着させないこと ①ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗ってください。②本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。付着した場合は直ちに洗い流してください。③塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流してください。 5. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること ①医師の治療を受けている人、②前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人、③本人又は家族が、薬や化粧品などによるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等）を起こしたことがある人、④重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧又はその既往歴のある人、 6. 使用後、次の症状があらわれた場合は医師又は薬剤師に相談すること（a）部位：恥部、腋窩（ワキの下）、眉 症状：発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等、（b）月経異常又は、男性化の兆候
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。