

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

プレフェミン®



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

| | | |
|---|------------------|--|
| 1 | 名 称 | プレフェミン |
| 2 | 成分・分量 | 1日量(1錠)中 チェストベリー乾燥エキス 40mg(チェストベリー180mgに相当) |
| 3 | 用法・用量 | 成人女性(18歳以上)、1回1錠を1日1回服用してください。 18歳未満は服用しないでください。 ・定められた用法・用量を守って、毎日服用してください。 また、月経開始直後から飲み始めた場合、1ヵ月程度で症状の改善を自覚できる可能性が高いです。 ・飲み忘れを防止するために、服用しやすい時間を定め、毎日決まった時間に服用してください。 |
| 4 | 効能・効果 | 月経前の次の諸症状(月経前症候群)の緩和:乳房のはり、頭痛、イライラ、怒りっぽい、気分変動 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために | 1. 次の人は服用しないでください。 (1)授乳中の人 (2)本剤又はチェストベリー(別名チェストツリー、アグニ)によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次の食品を摂取しないでください。 チェストベリー(別名チェストツリー、アグニ)を含む食品 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・漢方製剤を服用している人 ・うつ病の診断を受けた人 ・月経周期に関連なく乳房のはり、しこりがある人 ・月経不順の人 |
| 6 | 薬剤師が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。