

## 第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

## 説 明 文 書

## むし歯予防薬

エフコート® (フルーツ香味)

エフコート® メディカルクール香味

エフコート  
(フルーツ香味)エフコート  
メディカルクール香味

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	エフコート (フルーツ香味) / エフコート メディカルクール香味
2	成分・分量	(1mL中)フッ化ナトリウム 0.5mg
3	用法・用量	<p>4歳以上1回5～10mLを用い、1日1回、食後又は就寝前に次の方法により洗口(ブクブクうがい)する。</p> <p><b>【洗口方法】</b> 本剤を口に含み、歯面に十分ゆきわたるように30秒から1分間ブクブクうがいし、吐き出す。 1回に口に含む液量は、年齢等による口腔の大きさを考慮し、通常4～5歳で5mL、6歳以上で7～10mLである。</p> <p><b>【用法・用量に関連する注意】</b></p> <p>(1)飲んではいけません。(内服薬ではありません。)</p> <p>(2)定められた用法・用量を厳守してください。</p> <p>(3)小児が使用する場合は、保護者の指導監督のもとでご使用ください。</p> <p>(4)ガラガラうがいではなく、飲み込まないように注意して、ブクブクと洗口してください。</p> <p>(5)低年齢児や洗口の経験の少ない方は、水で洗口(ブクブクうがい)の練習を行い、確実に吐き出しができるようになってからご使用ください。</p> <p>(6)必ず添付の計量カップを使用し、1回量は一度に口に含んでください。</p> <p>(7)使用後は口を水などですすがず、また30分間は飲食しないでください。 (有効成分が口腔内から洗い流され、効果が低減するおそれがあります。)</p> <p>(8)誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれた場合には、牛乳(無い場合は水)をコップ1～2杯程度摂取し、医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。(嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状をやわらげる効果があります。なお、少量飲んだとしても、これらの症状があらわれない場合は、この処置は必要ありません。)</p>
4	効能・効果	むし歯の予防
5	保健衛生上の 危害を防止する ために 必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1)4歳未満の乳幼児。 (2)洗口(ブクブクうがい)ができない人。 (3)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> </ul>
6	薬剤師が 必要と判断する 事項	

## 〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。