

大正製薬(株)

リアップX5プラスローション

毛髪用剤

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

リアップX5プラスローション



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	リアップX5プラスローション
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5.0g ピリドキシン塩酸塩 0.05g トコフェロール酢酸エステル 0.08g /-メントール 0.3g
3	用法・用量	成人男性（20才以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2) 女性。</p> <p>(3) 未成年者（20才未満）。</p> <p>(4) 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。</p> <p>(5) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。</p> <p>(2) きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。</p> <p>3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください</p> <p>4. 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。 ・高血圧の人、低血圧の人。 ・心臓又は腎臓に障害のある人。 ・むくみのある人。 ・家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 ・高齢者（65才以上）。 ・次の診断を受けている人。 <p>甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	<p>〈 ご使用にあたって 〉</p> <p>お使いになる方の髪質や1ヵ所への集中塗布などにより、ごわつき感が出たり、くし通りが悪くなったり、部分的に白くなる（成分の結晶化）ことがあります。毎日洗髪を行い、頭皮を清潔にして、用法・用量を守ってお使いください。</p>

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。