

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

イノセアワンブロック



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	イノセアワンブロック
2	成分・分量	<1カプセル中>ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 75mg
3	用法・用量	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれたとき、成人(15才以上、80才未満)の方は、次のとおり水又はお湯で服用してください。 <1回服用量>成人(15才以上、80才未満) 1カプセル 小児(15才未満)および高齢者(80才以上)は服用しないでください <1日服用回数>1回 ●1回1カプセル、1日1回を限度として服用してください。 ●症状が治まった場合は、服用を止めてください。 ●3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師にご相談ください。 ●1週間を超えて続けて服用しないでください。
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき (本剤は、胃のヒスタミンH ₂ 受容体に拮抗する薬を含んでいます。)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩等のH ₂ ブロッカー薬によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ)を起こしたことがある人。 (2)医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。 ①血液の病気 ②腎臓・肝臓の病気 ③胃・十二指腸の病気 ④喘息・リウマチ等の免疫系の病気 ⑤ステロイド剤 ⑥抗生物質 ⑦抗がん剤 ⑧アゾール系抗真菌剤 (3)医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ないなどの血液異常を指摘されたことがある人。 (4)小児(15歳未満)および高齢者(80歳以上)。 (5)妊婦又は妊娠していると思われる女性ならびに授乳婦。 2. 本剤を服用している間は、他の胃腸薬を服用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3)薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)高齢者(65歳以上)。 (5)次の症状のある人。 のどの痛み、咳および高熱、原因不明の体重減少、持続性の腹痛
6	薬剤師が必要と判断する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。