

## 第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

## アラセナ S



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	アラセナ S
2	成分・分量	<1g中>ピダラビン 30mg
3	用法・用量	1日1~4回、患部に適量を塗布する。(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する) * 早期に使用すると治りが早く、ひどくなりにくいいため、ピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら出来るだけ早く(5日以内)に使用を開始してください。 * 使用時期は毎食後、就寝前を目安にご使用ください。
4	効能・効果	口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 医師による口唇ヘルペスの診断・治療を受けたことのない人。 (2) 患部が広範囲の人。 (3) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 6歳未満の乳幼児。 (5) 発熱、広範囲の発疹等の全身症状がみられる人。 2. 口唇や口唇周辺以外の部位には使用しないでください 3. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師又の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 授乳中の人。 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6) 湿潤やただれがひどい人。 (7) アトピー性皮膚炎の人。 <用法・用量に関連する注意> ・目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。 ・外用にのみ使用してください。 ・口に入れたり、なめたりしないでください。 ・家族で初めて発症したと思われる人が誤って使用しないよう、十分注意してください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## (注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。