

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

**アネトン®**



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	アネトンせき止め顆粒
2	成分・分量	4包(1日量)中 コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン) 60mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg、テオフィリン 160mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg
3	用法・用量	次の量を、水又はお湯で服用してください。成人(15歳以上)1回1包、11歳以上15歳未満1回2/3包、8歳以上11歳未満1/2包、1日3回(食後)服用。さらに就寝前に1回服用することができます。8歳未満服用しないでください。
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>してはいけないこと</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>この医薬品を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬</li> <li>服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。 (眠気があらわれることがあります)</li> <li>授乳中の人はこの医薬品を服用しないか、この医薬品を服用する場合には授乳をさけてください。</li> <li>過量服用・長期連用しないでください。 (倦怠感や虚脱感などがあらわれることがあります)</li> </ol> <p>相談すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人</li> <li>・発熱している小児 ・けいれんを起こしたことがある小児 ・高齢者</li> <li>・本人又は家族がアレルギー体質の人</li> <li>・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>・高熱、排尿困難の症状のある人</li> <li>・心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかんの診断を受けた人</li> </ul> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。