

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

大正胃腸薬Z



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	大正胃腸薬Z
2	成分・分量	2錠中 ラニチジン塩酸塩 63mg ケイ酸アルミン酸マグネシウム 250mg 酸化マグネシウム 100mg 水酸化アルミナマグネシウム 200mg
3	用法・用量	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれた時、成人（15才以上、80才未満）1回2錠 1日2回まで、水又はお湯で服用してください。 ●服用後5時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう2錠服用してください。ただし、1日2回（4錠）を超えて服用しないでください。●症状が治まった場合は、服用を止めてください。●3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談してください。●2週間を超えて続けて服用しないでください。
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき (本剤はH ₂ ブロッカー薬を含んでいます)
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください (1) ラニチジン塩酸塩等のH ₂ ブロッカー薬によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ）を起こしたことがある人。 (2) 医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。 血液の病気、腎臓・肝臓の病気、胃・十二指腸の病気、ぜんそく・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤 (3) 医師から赤血球数が少ない（貧血）、血小板数が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。 (4) 小児（15才未満）及び高齢者（80才以上）。 (5) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人並びに授乳婦。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の胃腸薬 3. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。 ・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・高齢者（65才以上）。 ・のどの痛み、せき及び高熱、原因不明の体重減少、持続性の腹痛の症状のある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。