

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

メディトリート



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	メディトリート
2	成分・分量	1 個中 ミコナゾール硝酸塩 100mg
3	用法・用量	成人（15 歳以上60 歳未満）、1日1回1個を就寝前に膣深部に挿入してください。 なお、6日間連続して使用してください。ただし、 <u>3日間</u> 使用しても症状の改善がみられないか、 <u>6日間</u> 使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。
4	効能・効果	膣カンジダの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）
5	保健衛生上の危害を防止するために	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 初めて発症したと思われる人。 本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人。 15 歳未満又は60 歳以上の人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、膣からの不規則又は異常な出血、膣又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。 次の診断を受けた人。糖尿病 ワルファリン等の抗凝血剤を服用している人。 本疾病を頻繁に繰り返している人。（1～2 ヶ月に1回又は6 ヶ月以内に2回以上） 膣カンジダの再発かわからない人。 次の部位には使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 膣内以外の部位。 本剤を使用中に次の医薬品を外陰部に使用しないでください <ol style="list-style-type: none"> カンジダ治療薬以外の外皮用薬。 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。・本人又は家族がアレルギー体質の人。 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。・授乳中の人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。 -45-