

販売元：第一三共ヘルスケア(株)
製造販売元：ダイト(株)

トランシーノ

しみ（肝斑に限る）改善薬

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

TRANSINO

[トランシーノ]



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	トランシーノ
2	成分・分量	1日量（6錠）中 トラネキサム酸 750mg、L-システイン 240mg、アスコルビン酸（ビタミンC）300mg、 ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）6mg、パントテン酸カルシウム 24mg
3	用法・用量	成人（15歳以上）1回服用量2錠、1日服用回数3回 15歳未満は服用しないで下さい
4	効能・効果	しみ（肝斑に限る）
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は服用しないで下さい トラネキサム酸を含有する内服薬を服用している人</p> <p>2. 次に該当する人はお申し出下さい (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 授乳中の人 (3) 55歳以上の人 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 血栓症のある人 (7) 血栓症を起こすおそれがある人 (8) 次の診断を受けた人 腎臓病</p> <p>ご自分のしみが、本剤の効能効果である肝斑かどうかの識別が難しい場合、また、色が黒ずんでおり、色調が不均一で、表面が隆起したようなしみ状のものがある場合は専門の皮膚科医に相談して下さい</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。 -53-