

販売元：ノバルティスファーマ(株)
製造販売元：同仁医薬化工(株)

ボルタレン AC(テープL/テープ)

経皮鎮痛消炎剤

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

ボルタレン[®] AC



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ボルタレン AC (テープL/テープ)
2	成分・分量	膏体 100g 中 ジクロフェナクナトリウム 1g
3	用法・容量	プラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2枚を患部に貼ってください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) ぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(4) 15才未満の小児</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。</p> <p>(1) 目の周囲、粘膜等</p> <p>(2) 湿疹、かぶれ、傷口</p> <p>(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部</p> <p>3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。</p> <p>4. 連続して2週間以上使用しないでください。</p> <p>次に該当する人はご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none">○ 医師の治療を受けている人○ 他の医薬品を使用している人○ 本人又は家族がアレルギー体質の人○ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人○ テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人○ 高齢者○ 消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザの診断を受けた人○ ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤(アスピリン等)、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤の投与を受けている人
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。