

## 第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

## 説 明 文 書

# フェイタス<sup>®</sup>Z



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	フェイタス Z (テープ剤)
2	成分・分量	膏体 100g 中 ジクロフェナクナトリウム 1.0g
3	用法・容量	プラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2) ぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(4) 15歳未満の小児。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。</p> <p>(1) 目の周囲、粘膜等。</p> <p>(2) 湿疹、かぶれ、傷口。</p> <p>(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。</p> <p>3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。</p> <p>4. 連続して2週間以上使用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。</p> <p>(2) 他の医薬品を使用している人。</p> <p>(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。</p> <p>(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(5) テープ剤（またはパップ剤）でかぶれ等を起こしたことがある人。</p> <p>(6) 次の診断を受けた人。</p> <p>消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ</p> <p>(7) 次の医薬品の投与を受けている人。</p> <p>ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤</p> <p>(8) 高齢者。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。