

販売元：(株)メイクトモロー  
製造販売元：松田薬品工業(株)

ストルピンMカプセル

精力増強剤（ヨヒンビン製剤）

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
**説 明 文 書**

# ストルピンMカプセル



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	ストルピンMカプセル
2	成分・分量	1カプセル(0.15g)中 塩酸ヨヒンビン6mg, ガラナエキス25mg, 反鼻末20mg その他、添加物として、バレイシヨデンブ、乳糖水和物及びアラビアゴム末を含有する。また、カプセル剤皮中添加物として、青色1号、赤色3号、ラウリル硫酸 Na、ゼラチン、酸化チタンを含有する。
3	用法・用量	1回1カプセル 1日3回服用してください。
4	効能・効果	神経衰弱性陰萎、衰弱性射精、老衰性陰萎
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>してはいけないこと</p> <ol style="list-style-type: none"><li>次の人は使用しないでください (1)本剤又は他のヨヒンビン製剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)現在、他のヨヒンビン製剤を服用している人。(3)15歳未満の小児</li><li>本剤を服用している間は次の医薬品を服用しないでください 他のヨヒンビン製剤</li><li>服用時は飲酒しないでください</li></ol> <p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"><li>次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1)下腹部臓器の慢性炎症、泌尿生殖器の炎症のある人又は排尿困難な人。 (2)心臓に障害のある人又は血圧の高い人。 (3)妊婦又は妊娠していると思われる女性。 (4)医師の治療を受けている人。(5)次の診断を受けた人。糖尿病</li><li>次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください (1)本剤の服用により、頭痛、悪心・嘔吐、手指のふるえ、首すじのしびれ、激しい動悸、のぼせ等の症状があらわれた場合。(2)しばらく服用しても症状の改善がみられない場合。</li></ol>
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。