

## 第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

## セルペロイシン錠



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	セルペロイシン錠 (錠)
2	成分・分量	2錠中 ローウォルフィアセルペンチナ総アルカロイド 2mg、コンドロイチン硫酸ナトリウム 100mg、ルチン 60mg、アスコルビン酸(ビタミンC) 50mg、アミノエチルスルホン酸 50mg、重酒石酸コリン 25mg、イノシトール 20mg、DL-メチオニン 20mg、アミノフィリン 10mg
3	用法・用量	次の1回量を朝夕、白湯又は水にて服用してください。 [服用目的：1回量：服用回数] 諸種高血圧症の治療：2錠：1日2回、 血圧降下後又は予防：1錠：1日2回 15歳未満の小児は服用しないでください。
4	効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本態性および腎性高血圧症</li> <li>●心臓機能障害あるいは大脳血行障害を伴う高血圧症</li> <li>●高血圧随伴症</li> <li>●動脈硬化の治療および予防</li> <li>●脳溢血・血管脆弱による出血予防</li> </ul>
5	保健衛生上の危害を防止するために	授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 消化性潰瘍、てんかん、腎不全、気管支ぜんそくの診断を受けた人
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。